



Prescription destinée
à _____

G·U·M®
Ortho

BROSSES A DENTS

- 124 **ORTHO** 
- 125 **ORTHO Ambulatoire**
Brins imprégnés d'un antiseptique (Chlorhexidine)
- 308 **MONTOUFFE**
Amincité et biseauté 

DENTIFRICES & BAINS DE BOUCHE

- 3080 **GUM® ORTHO GEL DENTIFRICE 75 ml**
CPC 0,05% + Fluorure de Sodium (1490 ppm)
- 3090 **BAIN DE BOUCHE 300 ml**
CPC 0,05% + Fluorure de Sodium et Olafur (400 ppm)
- 1770 **GUM® PAROEX® 0.12% CHX GEL DENTIFRICE 75 ml**
Traitement d'attaque
- 1784 **BAIN DE BOUCHE 300 ml**
CHX 0,12% + CPC + Vit. E + D-Pansthénol


INTERDENTAIRE

GUM® Trav-Ler®

Ambulatoire : le capuchon sert de manche

- 1312  0,6 mm
- 1314  0,8 mm
- 1412  0,9 mm
- 1414  1,1 mm
- 1512  1,2 mm
- 1514  1,3 mm
- 1612  1,4 mm
- 1614  1,6 mm
- 1618  2,0 mm
- 1699 multipack 9 références de Trav-Ler

Diamètre de passage entre les dents



CLICK Cliquez, c'est fixé !

- 625 **Manche double fixation**
- 422  0,9 mm
- 424  1,1 mm
- 622  1,4 mm
- 624  1,6 mm

Diamètre de passage entre les dents

- 2614 **BI-DIRECTION**
Simple à utiliser - Orientable en 2 positions
- 632 **SOFT PICKS™ Standard**
Bâtonnet caoutchouc - fluoré

ACCESS FLOSS Nouveau

- 3200 50 Fils épais et Passe Fils

PROTECTION

- 824 **RED-COTE**
Comprimés révélateurs de plaque
- 724 **CIRE DE PROTECTION**
Translucide et mentholée
- 2400 **GEL AftaClear™ 10 ml**
Acide hyaluronique

1. Utiliser la brosse à dents GUM® Ortho qui facilite le brossage autour des appareils orthodontiques grâce à la «coupe en V» de ses brins.



2. Utiliser le gel dentifrice et le bain de bouche GUM® Ortho spécifiquement formulés pour renforcer l'émail des dents et protéger les gencives. Ils favorisent la prévention des taches blanches de l'émail, réduisent la formation de la plaque et apaisent les gencives grâce à leurs actifs d'origine naturelle. Pour le rinçage, utiliser 10ml (bouchon doseur) de solution pure afin de prolonger l'effet antibactérien.

3. Compléter le brossage par l'utilisation de brossettes interdentaires GUM® Trav-Ler® ou Bi-Direction autour des arcs et des brackets.



4. Contrôler l'élimination de la plaque dentaire :
• Grâce aux comprimés révélateurs de plaque Red-Cote®
• A l'aide du Miroir Dentaire indispensable pour les zones difficilement visibles.

5. Protéger les muqueuses en appliquant la cire GUM® Ortho sur l'appareil. Transparente et prédécoupée, elle prend la teinte des dents et reste invisible.



6. En cas de lésions, appliquer le gel GUM® Ortho directement sur la zone concernée.


Notes :

La marque GUM® est disponible exclusivement en pharmacies et parapharmacies.



MODE D'UTILISATION

- 1 Utiliser une brosse interdentaire après le brossage des dents.
- 2 Glisser délicatement la brosse dans l'espace interdentaire et effectuer au moins 6 mouvements de va-et-vient. Ne pas «forcer» l'insertion d'une brosse si l'espace est trop étroit.
- 3 Rincer la brosse sous l'eau après utilisation. Jeter la brosse dès usure (entre 7 et 10 jours après la première utilisation).




TRAV-LER®

Plier la brosse au niveau du manche pour un meilleur accès au secteur postérieur. Ne pas plier la tige métallique au risque de la casser.



BI-DIRECTION

Faire glisser le poussoir vers l'avant ou l'arrière pour orienter la tête de la brosse.



(180° : secteur antérieur - 90° : secteur postérieur)

NOTE / PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

La marque GUM® est disponible **exclusivement en pharmacies et parapharmacies**.
Informations complémentaires sur www.gumgencives.fr